

# راهنمای پیشگیری و درمان هاری

## روشهای واکسیناسیون پیشگیری از هاری



روش اینترادرمال	روش عضلانی
۳ نوبت و در هر نوبت ۲ تزریق در دو عضو مختلف - حجم هر تزریق ۰٫۱ میلی لیتر	۴ نوبت و ۴ تزریق عضلانی در هر نوبت یک تزریق - حجم هر تزریق ۱ میلی لیتر
نوبت اول تزریق در اولین روز مراجعه	نوبت اول تزریق در اولین روز مراجعه
نوبت دوم تزریق در روز سوم	نوبت دوم تزریق در روز سوم
نوبت سوم تزریق در روز هفتم	نوبت سوم تزریق در روز هفتم
نوبت سوم تزریق در روز هفتم	نوبت چهارم تزریق در روز چهاردهم (در صورت متواری شدن حیوان و یا مرگ حیوان ظرف ۱۰ روز)

## تقسیم بندی از لحاظ نحوه مواجهه با حیوانات

انواع مواجهه با حیوان مشکوک یا مبتلا به هاری	اقدامات درمانی لازم جهت پیشگیری
<p><b>گروه یک</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- لمس کردن یا غذا دادن به حیوان مشکوک</li> <li>- لیسیدن پوست سالم توسط حیوان مشکوک</li> </ul>	<p>فقط شستشوی محل تماس با آب و صابون بمدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه</p>
<p><b>گروه دو</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- گاز گرفتن پوست</li> <li>- خراشیدگی کوچک و کم</li> <li>- ساییدگی بدون خونریزی</li> </ul>	<p>شستشوی محل بلافاصله با آب و صابون بمدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه + <b>تزریق بلافاصله واکسن هاری + تزریق واکسن توام + درمان موضعی زخم</b></p>
<p><b>گروه سه</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- گزیدگی ها و خراشیدگی منفرد و یا متعدد عمیق پوست " حداقل دیدن خون در ضایعه "</li> <li>- لیسیدن پوست آسیب دیده (قدیم و جدید) به هر دلیل</li> <li>- آلوده شدن غشاهای مخاطی (شامل چشم، پلک، دهان، بینی، ناحیه تناسلی و مقعد) با بزاق حیوان مشکوک (مانند لیسیدن)</li> <li>- هر نوع جراحت در سر، صورت، گردن و دست (نوک انگشتان تا مچ دست) و ناحیه تناسلی</li> <li>- مواجهه (تماس) با خفاش، گزش یا خراشیدگی توسط خفاش</li> <li>- افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی ارثی یا اکتسابی (ابتلا به بیماری و یا مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی)</li> <li>- هر نوع گزش توسط حیوان محتمل و قطعی مبتلا به هاری</li> </ul>	<p>شستشوی محل بلافاصله با آب و صابون بمدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه + <b>تزریق بلافاصله واکسن هاری و سرم ضد هاری + تزریق واکسن توام + درمان موضعی زخم</b></p>

• **در عضوی که سرم ضد هاری تزریق می شود واکسن هاری تزریق نگردد.** چون سرم باعث از بین رفتن اثر واکسن می شود.

• سرم ضد هاری، فقط یکبار و در اولین زمان ممکن پس از گزش (تا ۷ روز از تزریق اولین دوز واکسن) در افراد حائز شرایط دریافت سرم تجویز گردد.

• مقدار سرم ضد هاری ۲۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است که بایستی پس از محاسبه، همه آن در اطراف داخل محل جراحت بطور داخل عضلانی

تزریق شود و از تزریق باقی مانده سرم در جایی دورتر از زخم (عضله سرین) خودداری شود.

