

بسیج ملی تغذیه با شعار "اصلاح الگوی مصرف قندونمک و چربی"

بیماریهای غیرواگیر مهمترین علت مرگ و میر در کشور به شمار می‌روند، بطوری که ۷۶٪ کل بار بیماریها در ایران به بیماری‌های غیرواگیر اختصاص دارد. یکی از مهمترین عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر تغذیه نامناسب و مصرف زیاد قند، نمک و چربی است.

بیماریهای غیرواگیر مهمترین علت مرگ و میر در کشور به شمار می‌روند، بطوری که ۷۶٪ کل بار بیماریها در ایران به بیماری‌های غیرواگیر اختصاص دارد. یکی از مهمترین عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر تغذیه نامناسب و مصرف زیاد قند، نمک و چربی است. مطالعات انجام شده نشان داده است که تغذیه نامناسب و الگوی غذایی بیشترین علت بروز اضافه وزن و چاقی، بیماریهای قلبی عروقی، دیابت نوع ۲ و برخی انواع سرطان هاست. در حال حاضر بیماریهای قلبی عروقی علت اصلی مرگ در افراد بالای ۳۰ سال و دومین عامل مرگ در افراد ۵۹-۱۵ سال می‌باشد.

در این راستا دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از ۲۹ اذر تا ۱۴ دی ماه سال ۱۳۹۴، بسیج ملی تغذیه صحیح با شعار "اصلاح الگوی غذایی با کاهش مصرف قند، نمک و چربی" اعلام کرده است.

با اصلاح الگوی غذایی و کاهش مصرف قند، نمک و چربی به سلامت خود کمک کنید

و

شانس ابتلا به چاقی، بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و سرطان‌ها را کاهش دهد.

صرف زیاد قند، شکر و شیرینی‌ها باعث اضافه وزن و چاقی و افزایش فشارخون می‌شود که هر دو از عوامل مهم ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی است. مطالعات متعددی نشان داده است که مصرف زیاد مواد قندی به خصوص قند و شکر موجب افزایش کلسترول خون می‌شود و در صورتی که بیشتر از ۲۰ درصد انرژی روزانه از قند و شکر تامین شود، موجب بالا رفتن تری‌گلیسرید خون می‌شود.

بیماری قند نیز بیماری متابولیک مزمنی است که با سخت و ساز غیرطبیعی کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربیها همراه می‌باشد. نخستین و مؤثرترین شیوه کنترل دیابت، رعایت رژیم غذایی و در کنار آن ورزش‌های سبک نظری پیاده روی می‌باشد.

با تغذیه مناسب و اصلاح الگوی غذایی، کاهش مصرف قند، نمک و چربی و افزایش دریافت فیبرخطر ابتلا به سرطان ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. عوامل تغذیه‌ای که احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهند عبارتند از :

چربی‌ها : با احتمال ابتلا به سرطان‌های ریه، سینه، روده بزرگ و پروستات ارتباط دارد. اسیدهای میزان مجاز مصرف نمک در روز حدود ۵ گرم است. مصرف زیاد نمک علاوه بر سرطان معده

نمک : افزایش مصرف نمک با احتمال بروز سرطان معده ارتباط دارد. حداکثر میزان مجاز مصرف نمک در روز حدود ۵ گرم است. مصرف زیاد نمک علاوه بر سرطان معده با پوکی استخوان و افزایش فشارخون نیز همراه می‌باشد.

روش تهیه و طبخ نادرست مواد غذایی مانند فرآوری گوشت و تهیه انواع گوشت‌های دودی شده و نمک سود شده و یا اضافه کردن مواد شیمیایی و نگهدارنده به آنها در صنایع غذایی مثلاً "در انواع سوسیس و کالباس، هات داگ و کنسروهای گوشت، سبب تبدیل پروتئین گوشت به ترکیبات سرطان‌زا می‌شود.

استنشاقات بخارات روغن سوخته و قرار گرفتن درعرض بخار روغن‌های مورد استفاده برای سرخ کردن سریع غذا از علزمنه ساز سرطان ریه است.

صرف زیاد قند و شکر سmomی را در بدن تولید می‌کنند که باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان می‌شود. مصرف چای و قهوه همراه با قند و شکر و یا نوشابه‌های گازدار و آبجوه‌های حاوی صنعتی که حاوی قند زیادی هستند با خطر ابتلا به سرطان لوز المعده همراه است. مصرف زیاد قند و شکر و بالا بودن قند از طریق تاثیر بر توده بافت سینه شانس ابتلا به سرطان پستان را نیز افزایش می‌دهد.

صرف کم منابع غذایی فیبردار خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد. فیبر در انواع سبزیجها، میوه‌ها، چوبات و نان و غلات سیوسدار وجود دارد. نشان اینمنی و سلامت : نشان اینمنی و سلامت یک سبب سیز رنگ (نماد سلامت) می‌باشد که عبارت اینمنی و سلامت در کنار آن نوشته شده است. این نشان بر روی محصولاتی درج می‌شود که علاوه بر سالم و اینم بودن دارای یک خاصیت تغذیه‌ای مناسب و سلامت بخش مثل غنی شدن با املأح و ویتامین‌ها، کم بودن میزان چربی، نمک و نداشتن قند افزوده و بدون افزودنی‌های مصنوعی و شیمیایی و... می‌باشد. همواره محصولات غذایی دارای نشان اینمنی و سلامت را در اولویت خرید خود قرار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید

[دانلود پمقلتهای آموزشی](#)

لینک مطلب در سایت : <http://mrgums.ac.ir/?MID=21&Type=News&id=96>