

پرهیز از مصرف بستنی غیرپاستوریزه و سنتی از
راههای مهم پیشگیری از ابتلا به **تب مالت** است



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها



دانشکده علوم پزشکی مراغه

پرهیز از مصرف پنیر تازه و غیر پاستوریزه از
راههای مهم پیشگیری از ابتلا به **تب مالت** است



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها



دانشکده علوم پزشکی مراغه

استفاده از شیر پاستوریزه یا جوشاندن
شیر خام بمدت حداقل ۵ دقیقه از راههای
مهم پیشگیری از ابتلا به **تب مالت** است



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

دانشکده علوم پزشکی مراغه

خطر ابتلا به بیماری تب مالت با مصرف سرشیر، پنیر تازه و خامه افزایش می یابد.



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها



دانشکده علوم پزشکی مراغه

خطر ابتلا به بیماری تب مالت با مصرف گوشت و جگر کاملاً نپخته (نیم پز) افزایش می یابد



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

دانشکده علوم پزشکی مراغه

خطر ابتلا به بیماری تب مالت با مصرف سرشیر و خامه افزایش می یابد.



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

دانشکده علوم پزشکی مراغه

دامداران عزیز برای پیشگیری از ابتلا به تب مالت موارد زیر را رعایت کنید:

۱. استفاده از دستکش و لباس کار هنگام تماس و دوشیدن دامها
۲. پوشاندن دهان و بینی با ماسک یا پارچه تمیز در موقع نظافت طویله
۳. عدم تماس با ترشحات زایمانی، جفت و جنین سقط شده دامها
۴. شستن دستها با آب و صابون در پایان کار با دامها



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها



دانشکده علوم پزشکی مراغه

جهت پیشگیری از ابتلا به تب مالت بایستی
پنیر تازه تهیه شده به شکل سنتی و غیر پاستوریزه
حداقل بمدت ۳ ماه در آب نمک نگهداری و بعد
مصرف شود



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

دانشکده علوم پزشکی مراغه

مهمترین علائم بیماری تب مالت عبارتست از :

تب مداوم و مستمر

عرق فراوان بخصوص شبها

خستگی، بی اشتها، کاهش وزن

سردرد ، درد مفاصل، عضلات و استخوانها

راههای پیشگیری از ابتلا به تب مالت:

- ۱- عدم استفاده از پنیر تازه
پنیر تازه قبل از مصرف بایستی حداقل ۳ ماه در آب نمک نگهداری شده باشد
- ۲- عدم استفاده از مواد لبنی غیر پاستوریزه
در صورت استفاده از شیر غیر پاستوریزه بایستی قبل از مصرف حداقل ۵ دقیقه جوشانده شود
- ۳- واکسیناسیون دامها
- ۴- عدم تماس مستقیم با بافت های حیوان آلوده و مشکوک و نیز جنین سقط شده حیوانات

مهمترین راههای انتقال بیماری تب مالت:

**۱- مصرف شیر خام و فراورده های لبنی آلوده و غیر پاستوریزه
خصوصا پنیر تازه ، خامه و سر شیر، بستنی غیر پاستوریزه و
گوشت و جگر کاملا نپخته**

**۲- تماس مستقیم پوست با بافتهای آلوده دامی مثلا حین کمک
در زایمان دام مبتلا و مواد دفعی دامهای مبتلا**

۳- تنفس گرد و غبار موجود در هوای طویل و اصطبل دامها