

پیام های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت

1. آیا می دانید ویروس هپاتیت **B** از طریق تماس جنسی غیر ایمن، خون و فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ و سرسوزن آلوده و مشترک ،از طریق مادر به کودک منتقل می شود .
2. بیهیز از رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده، اجتناب از استفاده مجدد از سرنگهای یکبارمصرف و کنترل خون و فرآورده های خونی از راههای پیشگیری از هپاتیت می باشد .
3. خوردن و آشامیدن کارکنان در بخشهای بیمارستانی مهمترین عامل خطر ویروس هپاتیت **A** می باشد .
4. خون حاوی بالاترین تیترو ویروس هپاتیت **B** نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهمترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله بیمارستان ها می باشد.
5. دستها باید بلافاصله پس از دست زدن به بیمار همو دیالیز ، خون، مایعات بدن ، ترشحات ، مواد دفعی و وسایل آلوده ، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند
6. تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس هپاتیت **B** فقط از طریق آزمایش خون مشخص می باشد
- 7.

پیام های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت

1. آیا می دانید ویروس هپاتیت **B** از طریق تماس جنسی غیر ایمن، خون و فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ و سرسوزن آلوده و مشترک ،از طریق مادر به کودک منتقل می شود .
2. بیهیز از رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده، اجتناب از استفاده مجدد از سرنگهای یکبارمصرف و کنترل خون و فرآورده های خونی از راههای پیشگیری از هپاتیت می باشد .
3. خوردن و آشامیدن کارکنان در بخشهای بیمارستانی مهمترین عامل خطر ویروس هپاتیت **A** می باشد .
4. خون حاوی بالاترین تیترو ویروس هپاتیت **B** نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهمترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله بیمارستان ها می باشد.
5. دستها باید بلافاصله پس از دست زدن به بیمار همو دیالیز ، خون، مایعات بدن ، ترشحات ، مواد دفعی و وسایل آلوده ، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند
6. تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس هپاتیت **B** فقط از طریق آزمایش خون مشخص می باشد
- 7.

پیام های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت

1. آیا می دانید ویروس هپاتیت **B** از طریق تماس جنسی غیر ایمن، خون و فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ و سرسوزن آلوده و مشترک ،از طریق مادر به کودک منتقل می شود .
2. بیهیز از رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده، اجتناب از استفاده مجدد از سرنگهای یکبارمصرف و کنترل خون و فرآورده های خونی از راههای پیشگیری از هپاتیت می باشد .
3. خوردن و آشامیدن کارکنان در بخشهای بیمارستانی مهمترین عامل خطر ویروس هپاتیت **A** می باشد .
4. خون حاوی بالاترین تیترو ویروس هپاتیت **B** نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهمترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله بیمارستان ها می باشد.
5. دستها باید بلافاصله پس از دست زدن به بیمار همو دیالیز ، خون، مایعات بدن ، ترشحات ، مواد دفعی و وسایل آلوده ، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند
6. تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس هپاتیت **B** فقط از طریق آزمایش خون مشخص می باشد
- 7.

پیام های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت

1. آیا می دانید ویروس هپاتیت **B** از طریق تماس جنسی غیر ایمن، خون و فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ و سرسوزن آلوده و مشترک ،از طریق مادر به کودک منتقل می شود .
2. بیهیز از رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده، اجتناب از استفاده مجدد از سرنگهای یکبارمصرف و کنترل خون و فرآورده های خونی از راههای پیشگیری از هپاتیت می باشد .
3. خوردن و آشامیدن کارکنان در بخشهای بیمارستانی مهمترین عامل خطر ویروس هپاتیت **A** می باشد .
4. خون حاوی بالاترین تیترو ویروس هپاتیت **B** نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهمترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله بیمارستان ها می باشد.
5. دستها باید بلافاصله پس از دست زدن به بیمار همو دیالیز ، خون، مایعات بدن ، ترشحات ، مواد دفعی و وسایل آلوده ، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند
6. تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس هپاتیت **B** فقط از طریق آزمایش خون مشخص می باشد
- 7.